

# EVERMEC Injection

### Composition:

Each ml contains Ivermectin... 10mg (USP Specifications)

#### **Description:**

Evermec contains Ivermectin a broad spectrum Antiparasitic. Ivermectin belongs to the group of avermectins isolated from Streptomyces avermitilis. It is a member of macrocyclic lacton class of endectocides having a unique mode of action.

#### Mode of Action:

It binds selectively and with high affinity to glutamate gated chloride ion channels which are present in parasites nerve and muscle cells. This cause hyperpolarization of nerve and muscle cells of parasite resulting in paralysis and death of the parasite.

#### Indications:

Evermec injection is indicated for the control and treatment of internal & external parasites. It provides protection against gastrointestinal nematodes (Oestertagia, Haemonchus, Trichostrongylus Axei, Cooperia oncophora), lungworms (Dictyocaulus viviparous), Eye worms (Thelezia spp), warbles (Hypoderma bovis), mites (Psoroptes bovis, sarcoptes bovis), ticks (Rhiphicephalus, Boophilus) & lice of beef and dairy cattle, Buffalo, goat & camel.

# Advantages of using Evermec Injection:

- Broad spectrum efficacy
- Persistent activity against internal & external parasites
- Safe for all ages of animal
- High safety margins
- Small dose-quick action
- Effective against gastrointestinal nematodes for 10 days & against lungworms for 21 days.
- Effective against ticks for 21 days after treatment

#### Dosage & administration:

The recommended dose is 1ml for 50kg body weight (equivalent to 200mcg of Ivermectin/kg b.w) through subcutaneous route only in all animals



## **Contraindications & Warnings:**

Not for intramuscular or intravenous use. Cattle must not be treated within 21 days of slaughter for human consumption & camel for 28 days. Storage

Protect from direct sunlight and store below 30c. keep away from children.

Packing: 50ml Plastic Vial

ہر ملی لیٹر میں موجود ہے۔
آئیور میکٹن (بوالیں پی)۔۔۔۔۔، املی گرام۔
آئیور میکٹن ایک وسیع الاثر دوا ہے جو کمل طور پر اندرونی
اور بیرونی کرموں کا خاتمہ کرتا ہے۔ آئیور میکٹن کرموں پر
حملہ آور ہو کر ان کی چلنے پھرنے اور سانس لینے کی
صلاحت کوختم کر دیتا ہے جس سے ان کی موت واقع ہو
جاتی ہے۔ اس کی ایک خوراک جانور کے جسم میں تقریباً
ایک ماہ تک موجودرہتی ہے اور اس کو اندرونی اور بیرونی
کرموں سے محفوظ رکھتی ہے۔

علامان عاد

اپور میک انجکشن مویشیوں میں معدہ اور آنتوں کے کرم، چھپچھڑوں کے کرم، چھپچھڑوں کے کرم، خون چوسنے والے طفیلی کرم، جو وَل، چیچڑوں اور لائس کا تعمل خاتمہ کرتا ہے۔ خوراک:

گائے بھینس، بھیٹر، بکری اوراونٹ املی لیٹر فی ۵۰ کلوگرام جسمانی وزن (۲۰۰ مائیکروگرام فی کلوگرام جسمانی وزن ) ٹیکہ زیرجلدلگا ئیں۔

حتياط:

مویشیوں میں ٹیکدلگانے کے بعد ۲۱ دن تک ذبح کریں۔ ۲۵ ڈگڑی سنٹی گریڈسے کم درجہ حرارت پر کھیں۔ پیکنگ: ۵۰ کملی لیٹر وائل۔

Marketed by:



171-Shadman II, Lahore, Pakistan.